



## Ako dopestovať kvalitné priesady

Jar sa nezadržateľne blíži a je najvyšší čas vysievať plodiny, u ktorých je potrebný dlhší čas na dopestovanie kvalitných priesad. Vysievať by sme mali papriku, baklažán, zeler, por. V priebehu marca prakticky všetky ostatné plodiny, ktoré sa vysádzajú z predpestovaných priesad a to rajčiaky, kareláby, hlávkový šalát. Vysievame do skleníkov (vykurovaných) ale i debničiek v domácnosti.

### Ako dopestovať kvalitné priesady?

1. **Základom je správny termín výsevu** Doba dopestovania planty je rôzna preto jednotlivé druhy vysievame postupne. Najdlhšiu dobu potrebujú paprika a zeler. Papriky potrebujú orientačne okolo 60 dní od výsevu do výsadby, zeler podobne, v menej vhodných podmienkach aj viac. Predpokladom kvalitnej sadby je aby rastlinky nezastali v raste. V hustých výsevoch a nemožnosti rozsadiť priesady zastavia rast a veľmi ťažko ho opäť obnovujú. Papriku je vhodné rozsádzať vo fáze klíčnych listov až prvých pravých listov.
2. **Upravte osivo pred výsevom.** Osivo je vhodné namočiť na 24 hodín do vody. A to aj ošetrene osivo. Semena nasajú do seba vodu a vo vnútri semien sa spustia biochemické procesy, ktoré urýchlia klíčenie. Rastliny klíčia neporovnateľne rovnomernejšie a nedochádza k nerovnomernému vývinu vzhľadom na nerovnaký termín vzchádzania
3. **Zabezpečte im vhodnú teplotu** na klíčenie. Väčšina plodín vyžaduje vyššiu teplotu pri klíčení, požiadavky sú rôzne. Plodovej zelenine vyhovuje 25 °C, hlúbovinám 18 – 20 °C, šalátu okolo 20 °C. Po vyklíčení teplotu znížime aby nedochádzalo k „vytiahnutiu“.



4. **Doprajte im dostatok svetla.** Ak nemáte vhodné podmienky je dobre priesadám prísvetliť, zabránite ich vyťahovaniu a následnej krehkosti.

5. **Rosadíte ich** pre rast potrebujú priestor. Dopestovaná priesada rajčiakov a papriky by mala mať pevnú stonku, 8 až 10 pravých listov, nasadené prvé kvetné puky. Priesady uhoriek by mali mať vyvinuté 2 až 3 pravé listy, šalátu a kalerábu 3 až 4. Aspoň týždeň pred plánovaným vysádzaním treba rastlinky otužovať.

6. **Nepoužívajte neznáme substráty.** Substrát má mať jemnú štruktúru (napr. výsevné substráty), ak si ho chcete pripraviť sami, môžete preosiať rašelinu do ktorej primiešate piesok a perlit. Cez hlinité a ťažké substráty semená ťažko klíčia a substráty môžu byť napadnuté hubami.

7. **Vysejte ich rovnako hlboko.** Po výseve semená zasypeme preosiatou zeminou alebo pieskom. Semeno má byť prikryté asi troj- až päťnásobnou vrstvou zeminy, ako je jeho hrúbka. Opatrne zalejeme vodou izbovej teploty.



8. Po vzídení je vhodné ošetriť vzídené rastliny (ale môže sa i pred vzchádzaním) fungicídmi , ktoré nám zabránia padaniu mladých rastliniek.

Pri presádzaní (pykírovaní) ich vysádzajte do vhodných buniek . Plodová zelenina potrebuje bunky s priemerom minimálne 50 mm, šalátu a kalerábu postačí priemer 30 mm. Multiplatá umiestnite na stoly alebo rošty, aby korene neprerástli do pôdy do skleníka alebo fóliovníka. Planta predpestovaná v sadbovačoch sa lepšie ujíma (ako trhaná) a pri presádzaní nedochádza k porušovaniu koreňov. Rastliny po rozpresadení a ujatí pravidelne prihnojujte až do doby výsadby na trvalé stanovište.

